

## INFORMÁCIA PRE PACIENTA PO OČKOVANÍ - Pfizer Comirnaty

Vážená pacientka, vážený pacient,

**boli ste zaočkovaný vakcínou Comirnaty spoločnosti Pfizer. Radi by sme Vás informovali, že po očkovaní sa môžu objaviť vedľajšie účinky vakcinácie, ktoré uvádzame nižšie.**

1. Môžete pociťovať bolesťivosť, začervenanie, príp. opuch v mieste vpichu
2. V ojedinelých prípadoch sa môžu objaviť celkové prejavy – mierna horúčka, bolesť hlavy, bolesti svalov – stačí podanie liekov od teploty, od bolesti podľa Vašej znášanlivosti
3. V prípade dlhšie trvajúcich problémov je potrebné kontaktovať svojho všeobecného lekára
4. Po vakcinácii nie je vhodné požívať akékoľvek alkoholické nápoje (od prvého očkovania, až 7-10 dní po ukončení druhého očkovania).

**Upozorňujeme, že ochrana pred ochorením COVID-19 začína 2 týždne po podaní druhej dávky. Druhú dávku je možné podať najskôr 21 dní od podania prvej dávky.**

**Tretiu posilňujúcu dávku môže mať pacient aplikovanú najskôr 6 mesiacov od podania druhej dávky. Radi by sme vás upozornili, že pre podanie druhej a tretej dávky je potrebné so sebou priniesť doklad o podaní predchádzajúcej dávky.**

**Nadalej je potrebné dodržiavať protiepidemické opatrenia:**

**R (rúško) - O (odstup) - R (ruky)**